

## PATIENT INFORMATION LEAFLET

To access professional information on OBEL® LactaStop®, please visit [www.obellabs.co.za](http://www.obellabs.co.za)

SCHEDULING STATUS: S0

PROPRIETARY NAME (AND DOSAGE FORM): OBEL® LactaStop® (Capsules)

### **Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you.**

This medicine is available without a doctor's prescription, for you to treat a mild condition. Nevertheless, you still need to use it carefully to obtain the best results.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share medication with any other person.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- You must consult a doctor should your condition worsen, or does not improve after 30 days.

### 1. COMPOSITION OF OBEL® LactaStop®

OBEL™ LactaStop™ is a sugar-free formulation. The active substances are: *Mucuna pruriens* (Velvet Bean extract) 380 mg, *Salvia officinalis* (Common Sage extract) 50 mg, Pyridoxine (Vitamin B6) 33 mg. The other ingredients are: Chitosan-Lecithin nanospheres (1:1) 46 mg and Silicon dioxide (Silica) 2 mg.

### 2. INDICATIONS FOR OBEL® LactaStop®

LactaStop® suppresses the production and reduces the supply of breast milk. Thus, LactaStop® aids in the cessation of lactation and the discontinuation of breastfeeding.

### 3. BEFORE YOU TAKE OBEL® LactaStop®

Do not take OBEL® LactaStop®:

- If you are hypersensitive (allergic) to any of the ingredients listed.
- If you are pregnant or do not wish to stop breastfeeding.

### 4. DIRECTIONS FOR USE OF OBEL® LactaStop®

Take one (1) capsule three times (3x) a day, with or without meals. You should consult your doctor or pharmacist if you are unsure. If you have the impression that the effect of OBEL® LactaStop® is too strong or too weak, inform your doctor or pharmacist. It can take up to two weeks to see results. You should not need to take OBEL® LactaStop® for longer than three months.

If you take more OBEL® LactaStop®, you should consult your doctor or pharmacist.

If you forget to take / missed a dose of OBEL® LactaStop® do not take a double dose to make up for the missed dose. Carry on with the treatment as usual.

### 5. POSSIBLE SIDE EFFECTS

None known. If any unwanted effects occur, discontinue use immediately and consult your doctor or pharmacist.

#### 6. SPECIAL PRECAUTIONS/WARNING

This unregistered medicine has not been evaluated by SAHPRA for its quality, safety or intended use.

This medicine is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

#### 7. STORING OF OBEL® LactaStop®

Store in a cool, dry place (below 30°C).

Store out of reach of children.

#### 8. PRESENTATION OF OBEL® LactaStop®

60 capsules within a white plastic container, closed with a tamper-evident seal.

#### 9. IDENTIFICATION OF OBEL® LactaStop®

Clear capsules containing dark brown herbal powder.

#### 10. REGISTRATION NUMBER

016656 D 33.7 Combination Product. Complementary Medicine.

#### 11. NAME AND BUSINESS ADDRESS OF THE PROPOSED HOLDER OF CERTIFICATE OF REGISTRATION

Microbel Laboratories (Pty) Ltd, 86 Gazelle Ave, Corporate Park South, Old Pretoria Main Road, Midrand, Gauteng, 1685.

#### 12. DATE OF PUBLICATION

May 2018

## **VERBRUIKERS INLIGTINGSBLAADJIE**

Vir toegang tot professionele inligting aangaande OBEL® LactaStop®, besoek gerus [www.obellabs.co.za](http://www.obellabs.co.za)

SKEDULERINGSSTATUS: S0

EIENDOMSNAAM (EN DOSISVORM): OBEL® LactaStop® (Kapsules)

### **Lees hierdie blaadjie sorgvuldig vir belangrike inligting**

Hierdie medisyne is sonder 'n doktersvoorskrif beskikbaar vir die behandeling van 'n ligte toestand. Die medikasie moet noukeurig gebruik word, vir die beste resultate.

- Bewaar hierdie pamflet, aangesien inligting later dalk benodig word.
- Moenie hierdie medisyne deel met enigiemand nie
- Raadpleeg u apteker indien u meer inligting of advies benodig.
- Raadpleeg 'n dokter indien u toestand vererger, of nie na 30 dae verbeter nie.

## 1. SAMESTELLING VAN OBEL® LactaStop®

OBEL™ LactaStop™ is 'n suikervrye formulering. Die kapsule bevat die volgende aktiewe bestanddele: Mucuna pruriens ("Velvet Bean Extract") 380 mg, Salvia officinalis ("Common Sage Extract") 50 mg, Piridoksien (Vitamiene B6) 33 mg. Ander bestanddele: Chitosan-Lesitien -nanosfere (1: 1) 46 mg en Silikon-dioksied (Silika) 2 mg.

## 2. INDIKASIE VIR DIE GEBRUIK VAN OBEL® LactaStop®

LactaStop® onderdruk die produksie van borsmelk. LactaStop® help met die beëindiging van laktasie en staak borsvoeding.

## 3. VOORDAT U OBEL® LactaStop® gebruik

Moenie OBEL® LactaStop® gebruik indien:

- U allergies is vir enige bogenoemde bestanddele nie
- U swanger is, of wil borsvoed.

## 4. DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSINGS VIR DIE GEBRUIK VAN OBEL® LactaStop®

Neem een (1) kapsule, drie keer (3x) per dag, met of sonder etes. Enige onsekerheid moet met 'n Dokter of apteker uitgeklaar word. Indien u voel dat die effek van OBEL® LactaStop® te sterk of swak is, raadpleeg u dokter of apteker. Resultate kan tot twee weke neem. OBEL® LactaStop® moenie langer as drie maande gebruik word nie. Indien die aanbevole dosis oorskry word, moet u 'n dokter of apteker raadpleeg. Indien 'n dosis ® LactaStop® oorgeslaan is, moet die behandeling soos gewoonlik geneem word. Geen dubbeldosisse moet geneem word indien die normale dosis oorgeslaan is nie.

## 5. MOONTLIKE NEWE-EFFEKTE

Onbekend. Indien enige ongewenste effekte voorkom, staak gebruik onmiddellik en raadpleeg u dokter of apteker.

## 6. SPESIALE VOORSORGMAATREËLS

Hierdie medikasie is ongeregistreerd, en is dus nie deur SAHPRA geëvalueer vir gehalte, veiligheid of beoogde gebruik nie.

Hierdie medikasie is nie bedoel om enige siekte te diagnoseer, behandel, genees of te voorkom nie.

## 7. BERGINGSANWYSINGS VAN OBEL® LactaStop®

Bewaar in 'n koel, droë plek (onder 30°C).

Bewaar buite bereik van kinders.

## 8. AANBIEDING VAN OBEL® LactaStop®

60 kapsules in 'n wit plastiekhouer, gesluit met 'n slypskakel.

## 9. IDENTIFIKASIE VAN OBEL® LactaStop®

Kapsules wat 'n donkerbruin kruie-poeier bevat.

10. REGISTRASIENOMMER

016656 D 33.7 Kombinasieproduk - Aanvullende Geneeskunde.

11. NAAM EN BESIGHEIDSADRES VAN DIE HOUER VAN DIE VOORGESTELDE  
HOUER VAN DIE SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE

Microbel Laboratories (Edms) Bpk, Gazelle Ave 86, Korporatiewe Park Suid, Ou  
Pretoria Hoofweg, Midrand, Gauteng, 1685.

12. DATUM VAN PUBLIKASIE

Mei 2018